

INSTRUCCIONES DE MANEJO, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS (FIJAS SOBRE IMPLANTES)

DESCRIPCION

La *prótesis implanto-soportada* es un tratamiento que consta de una estructura protésica anclada mediante cemento o tornillos en los implantes que se le han colocado previamente dentro de los huesos maxilares, con el fin de recuperar al máximo la función y la estética de sus dientes.

LIMITACIONES

Se debe tener en cuenta que, según las diversas condiciones previas (entre las que destaca la cantidad y calidad de su hueso, y la vecindad de estructuras anatómicas importantes que podrían resultar dañadas por la colocación de los implantes), no siempre es posible alcanzar estos dos fines de forma absoluta.

La falta de hueso puede obligar, en ocasiones, a situar los dientes alejados de la encía, obligando a reproducir artificialmente una especie de encía que, por razones de higiene, debe quedar separada de sus verdaderas encías por unas columnas metálicas ancladas en los implantes (prótesis híbridas). En estos casos, aunque la cobertura por los labios permite dar una apariencia estética normal, el interior de la boca no es el natural.

INSTRUCCIONES DE MANEJO, CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para el éxito completo del tratamiento es imprescindible su colaboración, cumpliendo meticulosamente las normas de higiene y cuidado de sus prótesis.

Para conseguir un buen funcionamiento, deberá seguir detenidamente las siguientes *instrucciones de manejo, cuidado y mantenimiento*, que le facilitaran el empleo de elementos protésicos de su tratamiento e incrementaran su duración en condiciones apropiadas.

- Adaptación y acostumbriamiento

Tras la colocación de la prótesis precisara de un periodo variable de tiempo para habituarse a la nueva situación. Podrán notar los siguientes síntomas leves, de fácil y rápida recuperación:

- Sensación de presión. Se puede apreciar cuando se coloca por primera vez la prótesis sobre los implantes. Ira remitiendo espontáneamente.
- Dificultad para pronunciar determinados sonidos. Es aconsejable que lea en voz alta frente a un espejo y se escuche. De esta forma en poco tiempo adquirirá un habla clara y fluida.
- Sensación de ocupación o cuerpo extraño que desaparecerá por si sola debido a que la lengua y las mucosas se adaptaran al espacio de la nueva situación.
- Ligero y transitorio aumento de la cantidad de saliva.
- Mordisqueo de mejillas y de lengua.
- Es posible que note un ligero cambio en su apariencia y expresión derivado de su rehabilitación, en pocas semanas se acostumbrara a su nueva imagen.

- Recomendaciones

- Los dientes naturales tienen una gran capacidad de discriminar la fuerza que se ejerce con ellos, debido a que a su alrededor poseen estructuras formadas para este fin. Pero dichas estructuras no existen en los implantes y, por tanto, es posible llegar a ejercer una fuerza masticatoria muy elevada sin que usted pueda controlarla bien. Por ello deberá empezar a masticar alimentos no demasiado duros, para ir acostumbrándose poco a poco a las nuevas y engañosas sensaciones.

- Cuidados e higiene

El éxito y la duración del tratamiento dependerán de que usted cumpla con unas normas de higiene específicas para su prótesis que en un principio pueden parecer algo complicadas, pero que con el tiempo llegaran a ser un hábito fácil de llevar a cabo.

Debe tener en cuenta que su prótesis consta de:

- Prótesis (fija, sea cementada o atornillada)
- Pilares

- Para el cuidado de la prótesis:

- La prótesis se limpiara mediante cepillos dentales convencionales de la misma forma que limpia sus dientes, por la parte que se ve, es decir el lado de las mejillas y labios y del lado del interior de la boca.
- El lado que no se ve, es decir, el que queda hacia la encía, podrá limpiarse con una seda dental especial provista de un extremo duro (como el *Superfloss*®), o con cepillos interproximales cuando hay suficiente espacio para ellos (como ocurre con las prótesis híbridas).
- Las pastas dentales serán preferiblemente sin fluor o de bajo contenido en este elemento (porque daña la cerámica).

- Para el cuidado de los pilares:

- Los pilares son muy importantes. La unión del pilar con la encía se ha de limpiar siempre, pues es aquí donde se produce un mayor acumulo de bacterias y de restos alimenticios. Para ello existen cepillos especiales, llamados interproximales, que son de grosor variable.
- También son recomendables los irrigadores dentales para eliminar los restos que no han podido quitarse mediante el cepillado.
- Se recomienda el uso de colutorios o geles de clorhexidina al 0.2% en caso de inflamación de las encías.

Revisiones e incidencias

Es fundamental que cumpla con el programa de citas de revisión que le proponemos, en las cuales se le hará una serie de comprobaciones que tienen por objeto observar el funcionamiento correcto de su prótesis y el estado de los tejidos bucales.

En general, a falta de otras instrucciones, le realizaremos las siguientes revisiones: a la semana de haber sido colocada la prótesis, al mes y a los tres meses. Las siguientes revisiones serán trimestrales durante el primer año, y semestrales en lo sucesivo.









En este tipo de prótesis se pueden dar los siguientes problemas:

- Inflamación de la encía que rodea los implantes.
- Dolor.
- Aflojamiento de la prótesis: puede ser porque los tornillos de fijación se hayan desatornillado, soltado o incluso roto (raro).
- Fractura de dientes.
- Fractura de la prótesis.

C/ Capitán Grant, 4. 02003 Albacete. **Tlfno:** 967672777
e-mail: info@clinicadentalolivares.es www.clinicadentalolivares.es
Síguenos en Facebook Clínica Dental Olivares y
Twitter @OlivaresDental

¡¡Atención!! Siempre que aparezca una molestia en las encías, debe solicita cita, aunque al principio, como estas molestias son normales, puede esperar cuatro o cinco días. Si transcurrido este tiempo no hubieran desaparecido, o si empeoran con el paso de los días, o fueran importantes, adviértanoslo y pídanos cita inmediatamente.
Si surge algún problema, no intente resolverlo usted mismo. Solicite una cita a su dentista

Debe saber que la prótesis dental no es para toda la vida, al igual que sus dientes naturales no lo han sido.

<p>VITIS implant angular</p> <p>- El cuello del mango angulado y estrecho del cepillo aumenta la accesibilidad al implante, proporcionando una limpieza más eficaz en zonas de compleja higiene, tales como la cara interna del sector anterior y posterior de la cavidad oral. Además, esta angulación permite adaptarse anatómicamente a la forma de la cara y acceder fácilmente a las caras vestibulares.</p> <p>- Su cabezal de pequeño tamaño permite limpiar zonas que requieren mayor precisión.</p>  	<p>VITIS implant sulcular</p> <p>- Presenta un cabezal estrecho y lineal con filamentos suaves, distribuidos en dos hileras, que facilitan la limpieza del surco gingival y/o perimplantario, eliminando la placa dental (biofilm oral) acumulada en esta zona.</p>  	<p>VITIS implant monotip</p> <p>- El cabezal, de pequeño tamaño, presenta los filamentos dispuestos en un único monopenacho, diseñado especialmente para acceder a espacios muy pequeños que requieren una limpieza de máxima precisión de la rehabilitación protésica sobre implantes (aditamentos, barras).</p>  	<p>VITIS implant brush</p> <p>- Cepillo de uso diario para el cuidado y la higiene de personas con implantes dentales.</p> <p>- Presenta un cabezal pequeño y filamentos extrasuaves para una limpieza delicada y en profundidad de encías con problemas mucogingivales.</p>  
--	--	---	---



C/ Capitán Grant, 4. 02003 Albacete. **Tlfnº:** 967672777
e-mail: info@clinicadentalolivares.es www.clinicadentalolivares.es
Síguenos en Facebook Clínica Dental Olivares y
Twitter @OlivaresDental